Fertilizante

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO.

MONTY'S ROOT & BLOOM™

Fertilizante Liquido 2-15-15

Contenido Garantizado

Compuesto	p/v
Nitrógeno total (N) 0.5% Nitrógeno amoniacal (N) 1.5% Urea (N)	2%
Fosforo soluble (P_2O_5)	15%
Potasio soluble (K_2O)	15%
Hierro (Fe) Quelato de hierro	0.30%
Zinc (Zn) Quelato de zinc	0.05%

Derivado de hidróxido de amonio, urea, ácido fosfórico, hidróxido de potasio, hierro EDTA y Zinc EDTA.

Densidad: 1.45 g/ml a 25ºC

Precaución. Puede causar irritación dermal y seria irritación ocular.

Fabricante:
Monty's Plant Food Company
4800 Strawberry Lane
Louisville, KY 40209, USA
www.montysplantfood.com

Hecho en USA

Distribuidor:

Contenido neto: 9.46 LITROS

PAIS Nº REGISTRO MAG FECHA REG.

Número de lote: 122122
Fecha de Fabricación: 12/05/23
Fecha de Expiración: 11/05/26

MONTY'S PLANT & SOIL PRODUCTS

1.18.24 GT

MADE IN THE U.S.A

¡ALTO LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO!

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACION

INGESTIÓN: No provoque el vómito. De a beber 1 o 2 vasos de agua. Obtenga atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
INHALACIÓN: Traslade a la persona al aire libre. Acuda al médico en caso necesario.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua al menos 15 minutos.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE INMEDIATAMENTE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA DEL O LOS PRODUCTOS QUE ESTE UTILIZANDO. COMUNÍQUESE CON EL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES,
TELF: 2223-1028 o AL 911.

MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION AL AMBIENTE: Seguir las instrucciones de uso de la etiqueta, respetar las dosis recomendadas. No depositar cerca o en fuentes de agua. En caso necesario, disponer del producto en el sistema de alcantarillado sanitario según las recomendaciones de la autoridad competente.
Haga triple lavado a los envases. Asegúrese de darle un manejo y tratamiento adecuado a los envases del producto entregando los envases vacíos en los centros de acopio autorizados.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacenar este producto en lugares secos y bien cerrados. No es un producto corrosivo ni inflamable. No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave. Consérvese el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN PERSONAL: Se recomienda el uso de ropa protectora de trabajo. Las medidas anteriores son como previsión en caso de que algunas personas pudieran presentar algún tipo de reacción al producto.

AVISO DE GARANTÍA AL COMPRADOR: El formulador garantiza que el contenido de este envase según la composición química indicada en la etiqueta. No asume control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados al uso, el formulador no se responsabiliza de los resultados que se obtengan del mal uso de este producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos agrícolas de uso común. No mezclar con calcio. Es recomendable hacer una prueba de compatibilidad con los productos que se quiera mezclar antes de hacer y aplicar la mezcla final.

FITOTOXICIDAD: El producto no presenta riesgos de toxicidad en las dosis y los cultivos aquí recomendados.

1.18.24 GT

INSTRUCCIONES DE USO
EQUIPO DE APLICACIÓN: Antes de cargar el equipo de aplicación, revise que se encuentra en buen estado de funcionamiento, debidamente calibrado. Lave bien el equipo antes de aplicar este producto. Puede aplicarse con equipo aéreo o terrestre.
En aplicaciones vía aérea utilice un volumen de 10 a 60 l/ha. Para equipo aéreo se debe cumplir con las recomendaciones establecidas en el Decreto Nº 44083 MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS, Reglamento para Actividades Agrícolas.
En aplicación con equipo terrestre utilice un volumen de caldo de aplicación mínimo de 100 l/ha. Con fertirriego en piña, utilice un volumen de caldo de aplicación de 1000 a 3000 l/ha.
Cultivos de aplicación aérea: banano y plátano, arroz, caña de azúcar, algodón, palma aceitera, cítricos y piña.

USO RECOMENDADO: Root&Bloom es un fertilizante líquido versátil que se puede utilizar al plantar y como foliar en cualquier cultivo. Úselo cuando la calidad y el rendimiento sean los objetivos en la etapa de floración y en todos los cultivos de raíces durante todas las etapas de crecimiento.

Arroz (*Oryza sativa*), Banano y plátano (*Musa* sp), Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*), Piña (*Ananas comosus*), Algodón (*Gossypium hirsutum*), Maíz (Zea maiz), Frijol (*Phaseolus vulgaris*), Maní (*Arachis hypogaea*), Cañamo (*Cannabis sativa*).
Hortalizas: Brassicas: Brócoli, coliflor, repollo (*Brassica oleracea*). Solanáceas: Chile (*Capsicum annuum*), papa (*Solanum tuberosum*), tomate (*Solanum lycopersicum*), berenjena (*Solanum melongena*). Cucurbitáceas: Melón (*Cucumis melo*), Sandía (*Citrullus lanatus*), Pepino (*Cucumis sativus*), Ayote, Zapallo, calabacín (*Cucurbita* spp), Chayote (*Sechium edule*). Apio (*Apium graveolens*), Cebolla (*Allium cepa*), Culantro (*Coriandrum sativum*), Culantro coyote (*Eryngium foetidum*), Lechuga (*Lactuca sativa*), Esparrago (*Asparagus officinalis*), Zanahoria (*Daucus carota*), Fresa (*Fragaria* sp), Mora (*Morus* sp).
Café (*Coffea arabica*), Cítricos (*Citrus* sp), Mango (*Mangifera indica*), Macadamia (*Macadamia integrifolia*), Aguacate (*Persea americana*), Papaya (*Carica papaya*), Maracuyá (*Passiflora edulis*), palma aceitera (*Elaeis guineensis*), Rambután (*Nephelium lappaceum*), Pimienta negra (*Piper nigrum*), Uchuva (*Physalis peruviana*), Granadilla (*Passiflora ligularis*), Guayaba (*Psidium guajava*).
Flores, Ornamentales, Helecho hoja cuero (*Rumohra adiantiformis*)
Raíces y tubérculos: Nampí (*Colocasia esculenta*), Ñame (*Dioscorea alata*), Malanga (*Colocasia* sp), Tiquisque (*Xanthosoma* sp), Yuca (*Manihot esculenta*), Camote (*Ipomoea batata*), Jengibre (*Zingiber officinale*), Cúrcuma (*Cúrcuma longa*).

DOSIS E INTERVALOS DE APLICACION:
Aplicar de 1 a 5 L/ha.
Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo.
Es recomendable realizar análisis de suelo o foliares para establecer el programa de fertilización, según los requerimientos del cultivo.
PREPARACION DE LA MEZCLA: Agregue la mitad de agua al tanque, agregue el producto y termine de llenar el tanque.
FORMA DE APLICACIÓN: fertirriego, drench, foliar (aérea y terrestre).